L’Ami Fidèle

1975

Auteurs Maurice Dodion en Wasily Pedjko

Confrérie V Geslachten

Website: geslachten-lignages-hoegaarden.be

L'AMI FIDELE

1975 N° 1

Rédacteur en Chef: J. Vander Velpen, Bovenlo-Kessel-Lo
Secrétaire: H. Theyskens, Weert-St-Georges . C.C.P. 689132

Merci à tous les lecteurs qui ont bien voulu témoigner leur confian à la Rédaction!

Nous nous étions livrés à un petit pronostic au sujet du premier réabonnement que nous recevrions, et nous avons gagné: comme nous le pensions, c'est Louis et Joséphine NIHOUL qui ont été les premiers à faire parvenir leur cotisation.

Edouard Nihoul nous écrit:

"Voici les vers d'une de mes nièces. Aux amis de L'AMI FIDELE à deviner quel "bélier" se cache sous ce nom d'emprunt.

L'ivresse de mon coeur
éclate comme une bombe
Dans les nuages, le soleil rit...
La couronne d'un ciel fleurit.
L'horizon sans couleur
finit sa ligne...qui tombe
dans la mer endormie!

Pourtant, là-bas, au coeur
de la jongle, les bombes
se comptent comme grains de riz.
Plus un sourire, nul ne rit...
Des hommes sans couleur
reposent dans leur tombe
pour toujours endormis.

L'ivresse de mon coeur,
emportée par une bombe,
se meurt. Et l'immonde série
des génies malfaisants se rient
des bombes, des douleurs...
ils préparent les tombes
des hommes... à leur merci.

Jeannette Clépatereau.

Le Yang Tao ? Vous vous rappelez?

Nous avions appris dans le numéro précédent comment il pouvait se multiplier, et d'abord par semis. Voici maintenant le bouturage et le marcottage.

(Il paraît que certaines lectrices ont planté des pieds de Yang Tao. Nous espérons qu'elles nous en donneront des nouvelles!)

LE YANG TAO. (suite)

2. Bouturage

Deux sortes de boutures sont préconisées :
Celles à bois tendre ou rameaux de l'année et celles de racines
On les prélève durant la période de croissance jusqu'en septembre.
Les boutures de Yang Tao ont tendance à produire des cals, surtout si des hormones sont employées outre mesure. Et ces cals ne produisent pas de racines.
La meilleure méthode, pour élever ces boutures, est celle du mist-system " ou système par nébulisation. Ce brouillard peut être continuel ou intermittent, avec une chaleur de fond.
Dans ce système, les boutures dont les deux feuilles supérieures restent entières, sont plantées verticalement et émettent des racines, après 3 à 4 semaines.
La présence d'une surface foliaire permet une photosynthèse active favorisant un enracinement rapide.
Au Canada, pour la plupartdes boutures de différentes espèces de végétaux aucun ombrage n'est requis. Il faudrait expérimenter dans quelle mesure cela peut s'appliquer aux boutures de Yang Tao, le Yang Tao étant une plante de semi ombrage.
Différents substrats peuvent être employés soit seuls ou en mélange: tourbe, sable, peatmoss, vermiculite, perlite, kermazite et eau.
Tant de facteurs écologiques jouent l'un sur l'autre et différemment de région à une autre.
Ce qui est bon à la Nouvelle-Zélande ne l'est pas nécessairement au Laos ou à la Belgique.

Quant aux boutures de racines, elles doivent avoir la grosseur d'environ 3 cms. et une longueur de 5 à 8 cms.
Il faut les planter horizontalement et les recouvrir d'une mince couche de sol stérilisé, ou autre medium, le tout sous verre.

3. Marcottage.

Cette méthode très employée en Asie et qui a l'avantage de reproduire fidèlement des variétés supérieures, requiert du temps, de la place et une main d'oeuvre bon marché. Le marcottage se pratique en début de végétation
Marcotte en l'air ou marcotte dans le sol (simple, en serpentin, en butte) ont un pourcentage de réussite plus élevé que pour les boutures.
Pour les marcottes en l'air, on entoure l'anneau de cambium mis à découvert, soit de mousse, sphagnum, fibre de noix de coco ou de terre de jardin légère, tout matériel préalablement humecté d'eau que l'on maintient soit par du plastique, soit du bambou ou un pot coupé en deux.
L'avantage du plastique est qu'il permet l'échange du dioxide de carbone avec l'oxigène.
Il faut maintenir les marcottes humides, mais pas exagérément, pour ne pas provoquer de pourriture.
Les Chinois et les Indiens suspendent des vases de bambous, remplis d'eau, avec le fond laissant passer une corde laquelle est reliée à la marcotte.
Ainsi l'humidité est constante et sans exagération.

Simple

En butte

4. Greffage.

La greffe en fente et en écusson donnent les meilleurs résultats, excepté au moment des pleurs.
Si ces procédés permettent de reproduire des sujets fidèles à la plante mère et en un temps record, ils ne permettent pas toujours d'obtenir des plantes saines et vigoureuses.
Saines parce que des galles, cancers et moisissures ont été observés à l'endroit de l'union entre le porte greffe et le greffon.
Vigoureuses parce que la compatibilité entre le porte-greffe provenant de semis (à population très variable) et le greffon choisi n'est pas toujours très bien établie.
Ne faudrait-il pas faire un comptage de chromosomes aussi bien pour le porte greffe que pour le greffon?
Les actinidia arguta, chinensis et polygama ont généralement 116 chromosomes bien que Rizet ait aussi relevé pour le chinensis 160 chromosomes
Comme dans les greffes humaines du coeur et d'autres organes il y a aussi réjection dans la nature végétale.
Les signes de réjection sont une moindre résistance à la sècheresse, des feuilles plus petites sur la plante greffée que sur la plante mère, donatrice du greffon.
Pour remédier, il faudrait que les porte-greffes proviennent de boutures d'origine et variété connues dont la compatibilité aura préalablement été établie

5. Méristème.

La propagation végétative par culture de tissus in vitro est la dernière-née.
Le but premier de cette propagation par méristème fut d'abord d' obtenir des plantes exemptes de maladie à virus et dans la suite ce fut d'obtenir des plantes d'élite reproduisant fidèlement les performances de la plante mère
Jusqu'à présent, pour un tas de végétaux, avec des succès plus ou moins grands, par des cultures " in vitro " sur des milieux nutritifs très variés, de parties de plantes, depuis des bouts de racines jusqu' à des méristèmes et même des anthères de fleurs, on est parvenu à reproduire des plantules viables et commercialisables.
Récemment en 1969, à Paris, Mme Hirsch est parvenue en partant de fragments de tige d'actinidia à produire des tissus vivants donnant cals, feuilles et racines.
Il s'agirait donc de pousser plus à fond des recherches dans de sens, en partant du méristème ou autre partie de la plante et de la fleur.

Plantation.

La préparation du sol faite en automne, consistera en un labour profond avec enfouissement de fumures, d'engrais chimiques ou verts, appropriés selon l'analyse préalable du sol.
Il faudra aussi en noter le pH, se souvenant que le Yang Tao préfère les sols neutres à légèrement acides.
Un sol bien aéré et bien drainé est aussi important pour un bon départ de la future plantation

Quant à l'établissement de pergolas ou de haies fruitières , il s'agit de choisir la solution la meilleure pour chaque situation particulière. Il faut aussi se souvenir que le Yang Tao est une plante sarmenteuse plus grande et plus vigoureuse que la vigne et que le poids des fruits du Yang Tao est plus lourd que celui des raisins à surface égale. Il s'agit donc de prévoir des armatures solides et durables, en bois, en métal ou en ciment. Les poteaux en bois seront préalablement traités au créosote, ou carbonileum ou préservatif contre la pourriture et auront 15 à 20 cm d'épaisseur et au moins 3 m. de long dont 1/3 sera enfoui dans le sol.

Voici la suite de notre arbre généalogique.

GENERATION IV

Aa. Souche Vander Velpen Charlotte-Grolaux Georges

a) Enfants de Jean Piromet x 1939 Maria Grolaux

1.	Jean-Marie, 4.5.1940	X 1965	Bernadette Gielen
2.	Bernadette, 3.4.1941	X 1970	Christian Vierendeel
3.	Michel, 2.3.1942	X 1970	Anne Verhoeven
4.	Pierre, 14.9.43	X 1970	Agnès Defresne
5.	Bernard, 9.11.1944	X 1970	Béatrice Beirens
6.	Etienne, 19.11.1945	X 1973	Chantal Desar
7.	Marie-Agnès, 26.7.1946	x 1969	Jean-Louis Blero
8.	Jacqueline, 25.1.1950		
9.	Philippe, 17.3.51	X 1974	Geneviève Frères
10.	Jean-Louis, 18.6.1952	X 1974	Nicole Langlet
11.	Martine, 20.4.1954		
12.	Geneviève, 30.5.1959		

b) Enfants de Gaston Langhor X 1946 Elisabeth Grolaux

1.	Marie-Françoise, 10.5.1947	X 1972	Guy Jacob
2.	Philippe, 28.9.1948	X 1974	Liliane Betermier
3.	Martine, 18.9.1950		
4.	Jean, 16.11.1952		

c) Enfants de Jos Grolaux X 1942 Marcelle Van Keukelom

1.	Charles, 19.5.1943	X 1968	Georgette Brumagne
2.	Yves, 4.8.1944 - 31.1.1973		
3.	Danielle, 23.7.1945	X 1973	Charles Fraipont
4.	Guy, 9.3.1948	X 1971	Gisèle Debacker
5.	Vincent, 23.10.1973		

d) Enfants de Paul Grolaux X 1957 Mireille Degreef

1.	Isabelle, 31.7.1960		
2.	Pascal, 30.10.1961		

e) Enfants de Alain Rival X 1952 Hélène Grolaux

1.	Brigitte, 1954		
2.	Isabelle, 1961		
3.	Nathalie, 1966		

f) Enfants de Paul Langohr X 1951 Thérèse Grolaux

1.	Geneviève, 23.5.1952	X 1974	Jean Julémont
2.	Pierre, 10.5.1953		
3.	Marie-Hélène, 4.2.1956		
4.	Christine, 21.8.1957		
5.	Vincent, 21.12.1960		

g) Enfants de Albert Grolaux X 1955 Suzanne Lejeune

1.	Pierre, 6.3.1956		
2.	Jean, 28.3.1957		
3.	Carine, 11.10.1959		
4.	Benoit, 8.12.1960		
5.	Didier, 2.6.1962		
6.	Véronique, 15.9.1964		
7.	Damien, 5.6.1968		

h) Enfants de Pierre Grolaux X 1957 Ghislaine Bergh

1.	Fabienne, 5.1.1958		
2.	Geneviève, 16.6.1960		
3.	Thierry, 7.10.1961		
4.	Jean-Luc, 29.5.1968		